

Examenul de bacalaureat național 2015

Proba E. c)

Matematică $M_{\text{șt-nat}}$

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 8

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$ $z^2 - 2i = 2i - 2i = 0$	3p 2p
2.	$f(3) = 0$ $(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(0) = 2015$	2p 3p
3.	$x^2 - 5x = 3 - 3x \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$ $x_1 = -1$ și $x_2 = 3$	3p 2p
4.	$C_5^4 = \frac{5!}{4! \cdot 1!} = 5$	3p 2p
5.	Panta dreptei d este egală cu 2 Ecuația dreptei d este $y = 2x + 4$	2p 3p
6.	$A_{\Delta MNP} = \frac{12 \cdot 3 \cdot \sin 30^\circ}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$	3p 2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(0)) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$	2p 3p
b)	$\det(A(a)) = \begin{vmatrix} 1 & -a \\ -a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2$ $1 - a^2 = 0 \Leftrightarrow a_1 = -1$ și $a_2 = 1$	3p 2p
c)	$A(a)A(b) = \begin{pmatrix} 1+ab & -b-a \\ -a-b & ab+1 \end{pmatrix}$, $A(a+b) = \begin{pmatrix} 1 & -a-b \\ -a-b & 1 \end{pmatrix}$, $abI_2 = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix}$ $A(a+b) + abI_2 = \begin{pmatrix} 1+ab & -a-b \\ -a-b & 1+ab \end{pmatrix} = A(a)A(b)$, pentru orice numere reale a și b	3p 2p
2.a)	$f(0) = 0^3 - m \cdot 0 + 2 = 0 - 0 + 2 = 2$	3p 2p
b)	Restul este $(3-m)X$ $3-m=0 \Leftrightarrow m=3$	3p 2p
c)	$x_1 + x_2 + x_3 = 0$ $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = m(x_1 + x_2 + x_3) - 6 = m \cdot 0 - 6 = -6$	2p 3p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$	2p
	$f'(x) = e^x - 1$ și $f'(0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$	3p
b)	$e^x \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 0$	2p
	$f'(x) \leq 0$, pentru orice $x \in (-\infty, 0]$, deci f este descrescătoare pe intervalul $(-\infty, 0]$	3p
c)	$f'(0) = 0$ și $f'(x) \geq 0$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$, deci f este crescătoare pe intervalul $[0, +\infty)$	2p
	Cum f este descrescătoare pe intervalul $(-\infty, 0]$, obținem $f(x) \geq f(0) \Rightarrow e^x \geq x + 1$, pentru orice număr real x	3p
2.a)	$\int_0^1 (f(x) + 2x - 5) dx = \int_0^1 (x^2 - 2x + 5 + 2x - 5) dx = \int_0^1 x^2 dx =$	2p
	$= \frac{x^3}{3} \Big _0^1 = \frac{1}{3}$	3p
b)	$\int_0^2 \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(x^2 - 2x + 5) \Big _0^2 =$	3p
	$= \ln 5 - \ln 5 = 0$	2p
c)	$f(x) = (x-1)^2 + 4 \geq 4$, pentru orice număr real x	2p
	$\int_{2014}^{2015} \frac{1}{f(x)} dx \leq \int_{2014}^{2015} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big _{2014}^{2015} = \frac{1}{4}$	3p