

Examenul de bacalaureat național 2013

Proba E. c)

Matematică *M_mate-info*

Barem de evaluare și de notare

Varianta 9

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$b_4 = b_1 q^3 \Rightarrow q^3 = 27$ $q = 3$	3p 2p
2.	$x_V = 3$ $y_V = -1$	2p 3p
3.	$3^{x+2} = 3^{2(1-x)} \Rightarrow x+2 = 2-2x$ $x = 0$	3p 2p
4.	Numerele de două cifre, pătrate perfecte, sunt 16, 25, 36, 49, 64 și 81 \Rightarrow 6 cazuri favorabile Numărul de numere naturale de două cifre este 90 \Rightarrow 90 de cazuri posibile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{1}{15}$	2p 1p 2p
5.	$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 6\vec{i} - 8\vec{j}$ $AC = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = 10$	3p 2p
6.	$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$ $\sin A = 1$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(1)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$ $= -1$	2p 3p
b)	$A(m) \cdot A(-m) = \begin{pmatrix} 1-2m & 1 & 1-m \\ m & m & m \\ m-m^2 & m & m-m^2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1-2m & 1 & 1-m \\ m & m & m \\ m-m^2 & m & m-m^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow m = 1$	3p 2p
c)	$A(1) + A(2) + \dots + A(101) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 101 & 0 & 0 \\ 101 & 0 & 101 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101 & 101 & 101 \\ 101 \cdot 51 & 0 & 0 \\ 101 \cdot 51 & 0 & 101 \cdot 51 \end{pmatrix}$ $\det(A(1) + A(2) + \dots + A(101)) = \begin{vmatrix} 101 & 101 & 101 \\ 101 \cdot 51 & 0 & 0 \\ 101 \cdot 51 & 0 & 101 \cdot 51 \end{vmatrix} = -51^2 \cdot 101^3$	3p 2p

2.a)	$3 \circ 4 = 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 - 4 \cdot 4 + 20 =$ $= 4$	3p 2p
b)	$x \circ y = x(y-4) - 4(y-4) + 4 =$ $= (x-4)(y-4) + 4$, pentru orice numere reale x și y	3p 2p
c)	$x \circ x = (x-4)^2 + 4$	1p
	$\underbrace{x \circ x \circ \dots \circ x}_{x \text{ de } 2013 \text{ ori}} = (x-4)^{2013} + 4$	2p
	$(x-4)^{2013} + 4 = 5 \Rightarrow x = 5$	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = \frac{e^x(x+e^x) - e^x(1+e^x)}{(x+e^x)^2} =$ $= \frac{(x-1)e^x}{(x+e^x)^2}$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$	3p 2p
b)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+e^x} = 1$ Ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f este $y=1$	3p 2p
c)	$f'(1) = 0$; $f'(x) \leq 0$, pentru $x \in (0, 1]$ și $f'(x) \geq 0$, pentru $x \in [1, +\infty)$ $f(x) \geq f(1) \Rightarrow f(x) \geq \frac{e}{e+1}$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$	3p 2p
2.a)	$I_0 = \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big _0^1 =$ $= \frac{1}{2}$	3p 2p
b)	$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x e^{-nx^2} (e^{-x^2} - 1) dx$ Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și $x \in [0, 1]$ avem $e^{-nx^2} > 0$ și $e^{-x^2} - 1 \leq 0 \Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$	2p 3p
c)	Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ avem $I_n = \int_0^1 x e^{-nx^2} dx = -\frac{1}{2n} \int_0^1 (e^{-nx^2})' dx =$ $= -\frac{1}{2n} e^{-nx^2} \Big _0^1 = \frac{1}{2n} \left(1 - \frac{1}{e^n}\right)$	3p 2p