

**Examenul național de bacalaureat 2022**  
**Proba E. c)**  
**Matematică  $M_{tehnologic}$**   
**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Model**

*Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale*

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	$(\sqrt{8} + 1) \cdot (2\sqrt{2} - 1) - \sqrt{36} = (2\sqrt{2})^2 - 1 - 6 =$ $= 8 - 7 = 1$	3p 2p
2.	$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 5x - 1 = 5 + 2x$ Coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor $f$ și $g$ sunt $x = 2$ și $y = 9$	2p 3p
3.	$x^2 + 6x = x^2$ $x = 0$ , care convine	3p 2p
4.	Mulțimea $A$ are 10 elemente, deci sunt 10 cazuri posibile Numerele $n$ din mulțimea $A$ pentru care numărul $4 \cdot n$ este element al mulțimii $A$ sunt 0, 1 și 2, deci sunt 3 cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{3}{10}$	2p 2p 1p
5.	$2 = \frac{3 + x_C}{2}$ și $1 = \frac{4 + y_C}{2}$ , deci punctul $C$ are coordonatele $x_C = 1$ și $y_C = -2$ $OA = \sqrt{5}$ , $OC = \sqrt{5}$ și $AC = \sqrt{10}$ , deci $OA^2 + OC^2 = AC^2$ , de unde obținem că triunghiul $AOC$ este dreptunghic isoscel	2p 3p
6.	$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ , $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \cos A$ , deci $\sin A = \cos A$ , de unde obținem $\text{tg } A = 1$	2p 3p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.a)	$\det A = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-3) - (-6) \cdot 2 =$ $= -9 + 12 = 3$	3p 2p
b)	$A \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot A + A = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$ $A \cdot A + A = 2 \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = 2B(-1)$ , de unde obținem $x = -1$	2p 3p
c)	$B(a) \cdot A = \begin{pmatrix} 2a - 4 & -3a + 6 \\ 3 + 6a & -6 - 9a \end{pmatrix}$ , $B(3a) = \begin{pmatrix} 0 & 3a - 2 \\ 1 & 9a \end{pmatrix}$ , deci $B(a) \cdot A + B(3a) = \begin{pmatrix} 2a - 4 & 4 \\ 4 + 6a & -6 \end{pmatrix}$ , pentru orice număr real $a$ $\det(B(a) \cdot A + B(3a)) = -36a + 8$ , pentru orice număr real $a$ , deci $-36a + 8 = 4 \Rightarrow a = \frac{1}{9}$	3p 2p

<b>2.a)</b>	$1 * 2 = (1 \cdot 2 + 1)(1 + 2) =$ $= 3 \cdot 3 = 9$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$x * 0 = (x \cdot 0 + 1)(x + 0) = 1 \cdot x = x$ , pentru orice număr real $x$ $0 * x = (0 \cdot x + 1)(0 + x) = 1 \cdot x = x$ , pentru orice număr real $x$ , deci $e = 0$ este elementul neutru al legii de compoziție „ $*$ ”	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>c)</b>	$N = 2 \left( n + \frac{1}{n} \right) = 2n + \frac{2}{n}$ , pentru orice număr natural nenul $n$  $N$ este număr întreg, deci $\frac{2}{n}$ este număr întreg și, cum $n$ este număr natural nenul, obținem $n = 1$ sau $n = 2$	<b>2p</b> <b>3p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = e^x + (x-1)e^x - \frac{2x}{2} =$ $= xe^x - x = x(e^x - 1)$ , $x \in \mathbb{R}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{(x^2)'} =$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2} = 0$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) \geq 0$ , pentru orice $x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este crescătoare pe $\mathbb{R}$ Cum $x \leq 0 \leq x^2$ , pentru orice $x \in (-\infty, 0]$ , obținem $f(x) \leq f(x^2)$ , pentru orice $x \in (-\infty, 0]$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_1^2 (x+4)f(x) dx = \int_1^2 4x dx = 2x^2 \Big _1^2 =$ $= 8 - 2 = 6$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\int_1^4 \frac{1}{x} \cdot f(x^2) dx = 2 \int_1^4 \frac{2x}{x^2 + 4} dx = 2 \int_1^4 (x^2 + 4)' \cdot \frac{1}{x^2 + 4} dx = 2 \ln(x^2 + 4) \Big _1^4 =$ $= 2 \ln 20 - 2 \ln 5 = 4 \ln 2$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	Dacă $F : (-4, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a funcției $f$ , atunci $F'(x) = f(x)$ , pentru orice $x \in (-4, +\infty)$  $F''(x) = f'(x) = \frac{16}{(x+4)^2} > 0$ , pentru orice $x \in (-4, +\infty)$ , deci orice primitivă a funcției $f$ este convexă	<b>2p</b> <b>3p</b>